

# Atendimento a Urgências e Emergências nas Unidades de Saúde Populacional (Foco Ocupacional) - São Paulo



EMERGÊNCIA	URGÊNCIA	DEMANDA ELETIVA (NÃO URGÊNCIA)
<p>● <b>NEUROLÓGICO</b></p> <p>Alteração do nível de consciência ou agitação perigosa com necessidade de contenção química e risco de rebaixamento</p> <p>Paresia / Parestesia, distúrbio de fala, desvio de rima, alteração visual, dificuldade de equilíbrio</p> <p>Crise convulsiva em andamento</p>	<p>● <b>NEUROLÓGICO</b></p> <p>Cefaleia associada à febre, vômitos e dor cervical</p> <p>Crise convulsiva (no pós-evento)</p>	<p>+ Demais situações</p> <p>+ Pacientes com febre, sem outra alteração de SSVV (exceto taquicardia), medicado com antitérmico na triagem</p> <p>+ Pacientes com queixas respiratórias sem início imediato e sem alteração de SSVV</p> <p>+ Pacientes gestantes sem alteração de SSVV</p> <p>+ Pacientes com queixa algica sem alteração de SSVV e escala dor</p> <p>+ Pacientes com queixas ortopédicas sem início imediato ou &lt;5 dias</p> <p>+ Pacientes com queixas ortopédicas sem alterações de SSVV</p> <p>+ Pacientes com queixas ginecológicas sem alterações de SSVV</p> <p>+ Pacientes com queixas urológicas sem alterações de SSVV</p> <p>+ Pacientes com queixas urinárias sem alterações de SSVV</p> <p>+ Pacientes com queixas de mal-estar, sem sintomas definidos e alterações de SSVV</p> <p>+ Pacientes com cefaleia leve ou inespecífica, sem alteração SSVV/escala dor</p> <p>+ Pacientes com desconforto abdominal difuso, sem alterações de SSVV, início &lt;15 dias</p> <p>+ Pacientes com cansaço ou fadiga, sem alterações de SSVV</p> <p>+ Pacientes com solicitações de exames e encaminhamentos</p> <p>+ Pacientes que queiram solicitar trocas de receitas</p> <p>+ Pacientes com exames clínicos externos em busca de consulta para avaliação</p> <p>+ Pacientes com quadro alérgico sem início súbito</p> <p>+ Pacientes com quadro alérgico por picada de inseto sem prurido ou sinais flogísticos</p> <p>+ Pacientes com tosse &gt;7 dias</p>
<p>● <b>CARDIOVASCULAR</b></p> <p>PCR</p> <p>Hipotensão (PAS &lt;90 mmHg OU PAM &lt;65 mmHg) ou sintomas de baixo débito</p> <p>FC &lt;50 bpm ou &gt;120bpm, sintomático ou arritmico</p> <p>História de perda de consciência imediata ou recorrente</p> <p>Dor não traumática entre a mandíbula e andar superior do abdome</p>	<p>● <b>CARDIOVASCULAR</b></p> <p>Hipertensão PAD &gt;100 mmHg e/ou PAS &gt;180 mmHg, sem sinal de lesão de órgão-alvo: rebaixamento do nível de consciência, dor torácica, desconforto respiratório</p> <p>História de perda de consciência sem recorrência</p>	
<p>● <b>RESPIRATÓRIO</b></p> <p>Insuficiência respiratória (fala entrecortada, FR &gt;20 e/ou uso de musculatura acessória), independentemente da saturação e excluídos transtornos ansiosos</p> <p>Dessaturação significativa (SpO2 &lt;92%)</p> <p>Cianose presente</p>	<p>● <b>RESPIRATÓRIO</b></p> <p>SpO2 &lt;92%, porém habitual do paciente e sem sinais de desconforto (pneumopata prévio / usuário de O2 sem aumento de demanda)</p> <p>Dispneia sem dessaturação significativa (FR ≤ 20, sem uso de musculatura acessória e SpO2 ≥ 92%)</p>	
<p>● <b>TRAUMA</b></p> <p>Politrauma / Trauma grave ou de mecanismo grave / Trauma moderado com cervicalgia / TCE - em uso de anticoagulante, vômitos ou alterações neurológicas associadas</p> <p>FAF / FAB</p> <p>Sangramento ativo não compressível</p> <p>Sangramento com sinal de baixo débito: sudorese, palidez, taquicardia, pré-síncope</p> <p>Queimadura aguda com mais de 25% de área afetada</p> <p>Fratra evidente de grandes ossos com deformidade ou luxação*</p>	<p>● <b>TRAUMA</b></p> <p>Trauma moderado sem cervicalgia</p> <p>FCC com sangramento ativo e necessidade de sutura</p> <p>Sangramento intenso compressível</p>	
<p>● <b>OUTROS</b></p> <p>Ingestão excessiva de medicamentos / abuso de substâncias nas últimas 2 horas</p> <p>Reação alérgica com instabilidade hemodinâmica, dispneia ou estridor, risco de edema de glote (acometimento de língua, assoalho da boca, úvula ou orofaringe)</p> <p>Suspeita de sepse (infecção associada a marcador de disfunção orgânica)</p>	<p>● <b>OUTROS</b></p> <p>Dor súbita e intensa &lt;24 horas - cefaleia, cólica renal, dor abdominal, trauma de grandes ossos ou cervicolumbalgia</p> <p>Desidratação com letargia e/ou alteração de sinais vitais, mucosas ressecadas</p> <p>Distúrbio psiquiátrico com agitação ou ideação suicida</p> <p>Diabéticos com sintomatologia compatível com hipoglicemia</p> <p>Ingestão excessiva de medicamentos / abuso de substâncias &gt;2 horas</p> <p>Suspeita de doenças infectocontagiosas contagiosas que necessitem de isolamento</p> <p>Gestante com dor abdominal ou sangramento vaginal</p> <p>Pacientes em vigência de quimioterapia</p> <p>Suspeita de infecção + 2 critérios de SIRS (sem disfunção orgânica)</p>	
<p><b>LOCAL DE ATENDIMENTO:</b> Todos os atendimentos deverão ocorrer na Sala de Estabilização.</p>	<p><b>LOCAL DE ATENDIMENTO:</b> Todos os atendimentos podem ocorrer no consultório da triagem ou na Sala de Estabilização.</p>	<p><b>LOCAL DE ATENDIMENTO:</b> Os atendimentos podem ocorrer no consultório de triagem.</p>