



Educação do Paciente/Familiar

Administração de Remédios Via Sondas e Ostomias



Orientações gerais:

- Ao receber a sua receita, questione o médico e/ou farmacêutico se os seus remédios podem ser feitos por sondas.
- Nem todos os remédios sólidos podem ser macerados. Por isso, quando for possível, opte por remédios líquidos.
- Se precisar cortar ou triturar um comprimido, utilize um cortador de comprimidos ou recipiente apropriado, preferencialmente de vidro ou porcelana. Utilize-o somente para esse fim. Lembre-se de limpá-lo a cada uso com água e sabão neutro.
- Cada remédio deve ser preparado individualmente.
- Não macerar ou diluir todos juntos para administrá-los pela sonda.
- Após administrar um remédio por sonda, lembre-se de lavá-la antes de administrar o próximo remédio.

Dispositivo:

Volume para lavar a sonda:

- Atenção aos remédios que possuem sigla no nome, como XR, CR, XRO, DR, ER, BD. Consulte o farmacêutico para saber se podem ser administrados por sonda.
- Caso o paciente receba dieta pela sonda de forma contínua, lembre-se de pausá-la sempre que for administrar um remédio. É necessário lavar a sonda antes e após administrar o remédio para, depois, reiniciar a dieta.



Como preparar cada remédio?

Lembre-se sempre de higienizar as mãos antes de manipular os remédios.

COMPRIMIDOS

- Coloque o comprimido no recipiente apropriado e o triture até formar um pó sem partículas.
- Adicione 10 ml de água mineral e misture até que todo o pó esteja diluído.
- Aspire o conteúdo com uma seringa e administre pela sonda.

CÁPSULA

- Abra a cápsula no recipiente ou copo e deixe que o conteúdo caia em seu interior. Despreze a parte dura da cápsula.
- Não triture o conteúdo das cápsulas.
- Adicione 10 ml de água mineral e misture até que todo o pó esteja diluído.
- Aspire o conteúdo com uma seringa e o administre pela sonda.

DRÁGEA

- Coloque a drágea em um copo ou almofariz com 10 ml de água mineral.
- Espere que a drágea se dissolva completamente.
- Aspire o conteúdo com uma seringa e o administre pela sonda.

SUSPENSÕES

- Agite bem a suspensão.
- Com a ajuda de uma seringa, aspire o volume prescrito e o administre pela sonda.



Dúvidas:

Use esse remédio conforme prescrito pelo seu médico. Em caso de dúvidas sobre remédios, o serviço de **Farmácia do Hospital Sírio-Libanês** disponibiliza o **Núcleo de Assistência Técnica e Educação Farmacêutica (NATEF)** para que os farmacêuticos possam esclarecê-las.

E-mail: natef@hsl.org.br | Telefone: (11) 3394-4955.

Farmacêutico Clínico:		
Data:	Celular Corporativo:	Telefone:
		(11) 3394-4955



**HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS**



Comitê de Ativação e
Educação do Paciente