

Educação do Paciente/Familiar

Doença Arterial Coronariana (DAC)



SÍRIO-LIBANÊS



Orientação Farmacêutica:

Mesmo com todos os cuidados que já apresentamos a você, os medicamentos desempenham um papel fundamental no seu tratamento. É essencial estar atento a alguns cuidados especiais com eles para garantir que tudo dê certo - sempre se lembrando de seguir rigorosamente a prescrição médica!



Uso de Remédios:

Os remédios para a manutenção do tratamento após angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica devem ser tomados sempre no mesmo horário. Caso esqueça uma dose, tome a próxima dose assim que se lembrar. Porém, se você se lembrar muito perto da próxima dose, pule a dose esquecida. Não tome duas doses ao mesmo tempo ou doses extras, isso pode aumentar o risco de reações adversas, sem benefício no seu tratamento. Utilize alarmes ou despertadores para não se esquecer de tomar seus remédios. Mantenha uma lista de todos os remédios prescritos sempre com você. Continue tomando os remédios receitados pelo médico, mesmo que você se sinta melhor. Somente seu médico pode avaliar se uma redução da dose ou a suspensão do remédio trará benefícios para você. Se os sintomas ou sua condição não melhorarem ou piorarem, entre em contato com seu médico.



Antiagregante Plaquetário:

Ácido acetilsalicílico, Clopidogrel, Prasugrel e Ticagrelor. Esses remédios são responsáveis por diminuir a aglomeração de plaquetas presentes no sangue e, assim, dificultam a formação de coágulos. Desta forma, deixam o sangue mais fluido.



Antes de iniciar o tratamento com um desses remédios, informe seu médico:

- ➔ Se você é alérgico a esse remédio. Informe sobre a alergia e os sinais que teve;
- ➔ Se você tem algum dos seguintes problemas de saúde: asma, problemas de sangramento, pólipos nasais ou irritação nasal, doença renal, doença hepática, histórico de hemorragia ou úlcera gastrintestinal;
- ➔ Se você estiver tomando outro remédio que contenha o mesmo princípio ativo;
- ➔ Se você estiver tomando algum anti-inflamatório não esteroidal (por exemplo: diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno etc.).



Informe ao seu médico se você apresentar os seguintes sintomas:

- Sinais de uma reação alérgica (erupção na pele, urticária);
- Sinais de sangramento (vômito ou tosse com sangue, fezes escurecidas, sangramento das gengivas, sangramento vaginal anormal, hematomas sem causa ou que ficam maiores).



Quais são outros possíveis efeitos colaterais desses remédios?

- Dor de estômago ou azia;
- Sensação de falta de ar ou respiração pesada (Ticagrelor).



Onde e como devo guardar e/ou desprezar o medicamento?

Guarde-o longe do alcance de crianças e de pessoas que não estejam com plena capacidade mental, em local seco, em temperatura ambiente e protegido da luz. Armazene-o na embalagem original para protegê-lo da umidade. Jogue o remédio fora se estiver vencido. Quando for necessário descartá-lo, não utilize o lixo comum ou o vaso sanitário.

Acesse o **QR Code ao lado** e confira os locais mais próximos que recebem materiais e remédios para descarte. Sua atitude contribuirá com o meio ambiente e a segurança de todos.

Acesse o QR Code e insira seu CEP para descobrir as farmácias mais próximas:



Dúvidas:

Use esse remédio conforme prescrito pelo seu médico. Em caso de dúvidas sobre remédios, o serviço de **Farmácia do Hospital Sírio-Libanês** disponibiliza o **Núcleo de Assistência Técnica e Educação Farmacêutica (NATEF)** para que os farmacêuticos possam esclarecer-las.

E-mail: natef@hsl.org.br | Telefone: (11) 3394-4955.

Farmacêutico Clínico:

Data:

Celular Corporativo:

Telefone:

(11) 3394-4955



Tratamento e Prevenção Cardiovascular:

Antiagregantes Plaquetários

Medicamento	Dose	Iniciado em:


Controle do Colesterol

Medicamento	Iniciado em:	Dose	LDL Colesterol (Data)
Meta terapêutica - manter LDL menor que:			

Em caso de sangramentos e demais suspeitas de relação adversa, entre em contato com o profissional médico de referência. **Não tome medicamentos sem orientação médica.**



Seguir o tratamento reduz o crescimento das placas de gordura, diminuindo a chance de um novo infarto.





SÍRIO-LIBANÊS