



## *Educação do Paciente/Familiar*

# **Rivaroxabana (Xarelto®)**



## **O que é Rivaroxabana (Xarelto®)?**

É um remédio anticoagulante para o tratamento e prevenção da formação de coágulos (trombose).



## **Como devo tomar esse remédio?**

Tome o remédio sempre no mesmo horário com água. Se sentir dores de estômago, pode tomá-lo com alimentos. Se estiver tomando mais de 15 mg por dia, recomenda-se ingeri-lo imediatamente após a refeição. Caso não consiga engolir o comprimido, você pode triturá-lo e misturá-lo com 50 ml de água e ingeri-lo imediatamente após a diluição.



## **O que devo fazer quando esquecer alguma dose?**

- Se você utiliza 15 mg, 2 vezes ao dia: tome a dose esquecida assim que se lembrar. Você pode tomar 2 comprimidos de uma vez, pois é importante que receba 30 mg no dia. No dia seguinte, volte ao normal, utilizando 15 mg em duas tomadas diferentes.
- Se você utiliza outro esquema de dose: tome a dose esquecida assim que se lembrar. Se estiver muito próximo do horário da próxima dose, pule a dose esquecida. Não tome mais de uma dose ao mesmo tempo.



## **Quais cuidados devo tomar?**

- Caso consulte outro médico e/ou dentista, avise que você está utilizando esse remédio.
- Se você vomitar depois de ter ingerido o comprimido, não tome uma segunda dose no mesmo dia.
- Se você tomar accidentalmente mais comprimidos do que deveria, contate seu médico imediatamente.
- Há remédios que podem aumentar ou diminuir o efeito do anticoagulante; portanto, não tome remédios sem orientação médica. Atente-se também aos produtos naturais, como Ginkgo biloba, Erva-de-São-João e Toranja, que também podem interagir com a Rivaroxabana. Não faça uso sem avisar seu médico.

# Quais efeitos indesejados esse remédio pode provocar?

Todos os remédios podem causar reações adversas; entretanto, muitas pessoas não apresentam efeitos indesejáveis ou os apresentam em menor intensidade. Esse remédio pode aumentar o risco de sangramento no caso de ferimentos ou traumas; então, seja cuidadoso. Outros sinais de sangramento podem aparecer espontaneamente (exs.: vômitos com sangue, sangue na urina, fezes escurecidas ou avermelhadas, sangramento vaginal anormal, hematomas, sangramento nasal). Outras possíveis reações adversas são tontura e dores de cabeça. Avisar seu médico caso ocorra qualquer efeito não desejável.

## Onde e como devo guardar e/ou desprezar o remédio?

Guarde-o longe do alcance de crianças e de pessoas que não estejam com plena capacidade mental, em local seco, em temperatura ambiente e protegido da luz. Armazene-o na embalagem original para protegê-lo da umidade. Jogue o remédio fora se estiver vencido. Quando for necessário descartá-lo, não utilize o lixo comum ou o vaso sanitário. Acesse o QR Code ao lado e confira os locais mais próximos que recebem materiais e remédios para descarte. Sua atitude contribuirá com o meio ambiente e a segurança de todos.

Acesse o QR Code e insira seu CEP para descobrir as farmácias mais próximas:



## Dúvidas:

Use esse remédio conforme prescrito pelo seu médico. Em caso de dúvidas sobre remédios, o serviço de **Farmácia do Hospital Sírio-Libanês** disponibiliza o **Núcleo de Assistência Técnica e Educação Farmacêutica (NATEF)** para que os farmacêuticos possam esclarecer-las.

**E-mail: natef@hsl.org.br | Telefone: (11) 3394-4955.**

Farmacêutico Clínico:		
Data:	Celular Corporativo:	Telefone:
		(11) 3394-4955



**HOSPITAL  
SÍRIO-LIBANÊS**



Comitê de Ativação e  
Educação do Paciente